



PROSPECTO

SuaviPlant® rectal 6,25 g pomada

Destilado de Hamamelis virginiana

Composición:

100 g de pomada contienen:

Principio Activo:

6,25 g de destilado de hojas y ramas frescas de *Hamamelis virginiana* (Hamamelis) (1:1,6).

Otros componentes:

Lanolina, parafina sólida, *Softisan 649* (Glicerol (mono, di, tri) (adipato, alconato (C_x-C_y), isoestearato), alcohol cetilestearílico, *Oxynex LM* (Ácido cítrico, monooleato de glicerilo, monoestearato de glicerilo, ácido L-(+)-6-O-palmitoil ascórbico, DL- α -tocoferol, lecitina), parafina líquida densa, vaselina blanca, edetato disódico 2H₂O, propilenglicol, esencia de Hamamelis, agua purificada.

Forma farmacéutica y contenido del envase: Pomada. Estuche de cartón conteniendo un tubo de aluminio con 35 g ó 50 g de pomada y un aplicador.

Actividad: Fármaco dermatológico a base de plantas con propiedades astringentes de los tejidos.

Titular y responsable de la fabricación:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
Willmar-Schwabe-Straße 4

76227 Karlsruhe / Alemania

FARMACIA
LA ESTACIÓN

Indicaciones: Alivio local sintomático de las hemorroides.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la especialidad.

Precauciones: Si los síntomas persisten o si se produce irritación o empeoramiento a pesar de dosificación suficiente y regular, consulte a su médico.

Si nota la aparición de sangre en las heces o hemorragia en la zona del ano consulte a su médico.

Si utiliza condones de látex debe tener en cuenta que el uso de **SuaviPlant rectal 6,25 g pomada** en la zona de los genitales y/o ano puede disminuir la resistencia de los condones y con ello su seguridad, debido a los excipientes parafina y vaselina.

Interacciones: No se han descrito. Sin embargo, no aplicar simultáneamente y en el mismo sitio con otras preparaciones tópicas.

Advertencias:

Embarazo y lactancia:
No se han descrito

Efectos sobre la capacidad de conducción:
No se han descrito

Posología:

Aplicar varias veces al día, según necesidad, en forma de capa fina sobre la zona afectada.
Continuar el tratamiento hasta la desaparición de los síntomas.

Instrucciones para la correcta administración del preparado: Aplicar sobre la zona afectada. En caso de hemorroides internas utilizar el aplicador.

Sobredosificación: No se conocen casos de sobredosis hasta la fecha. En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, acudir a un centro médico inmediatamente o llamar al Servicio de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Reacciones adversas: En casos muy raros se han presentado reacciones de tipo alérgico.
Si observa ésta o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Almacenar en lugar seco y por debajo de 25°C

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Sin receta médica

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Texto revisado: Abril 2000

(logo Schwabe)

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe / Alemania

Comercializador por:
Madaus, S.A.
Foc, 68-82 08038 Barcelona (España)

