

# Pankreoflat<sup>®</sup> grageas

## PROPIEDADES

**Pankreoflat<sup>®</sup> grageas** es una asociación de enzimas digestivas pancreáticas y Dimeticona que disminuye la formación de gases.

## COMPOSICION

Cada gragea contiene: Pancreatina, c.s.p. 6.000 U. FIP de Amilasa, 6.000 U. FIP de Lipasa y 400 U. FIP de Proteasa; Dimeticona (DCI), 80 mg. Excipientes: Sacarosa, 256,4 mg; Hidroxipropilcelulosa, Estearato de magnesio, Copolímero vinilpirrolidona/acetato de vinilo, Goma laca, Talco, Polivinilpirrolidona, Polietilenglicol 6000, Carboximetilcelulosa sódica, Dióxido de titanio y Cera éster.

## INDICACIONES

Alivio sintomático de las alteraciones digestivas en las que se produce aerofagia (deglución de aire) o flatulencia (gases), como pesadez de estómago y digestiones lentas relacionadas con insuficiencia de enzimas pancreáticas.

## POSOLOGIA

Adultos: 1 a 2 grageas en cada comida, ingeridas sin masticar.  
Niños: Consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Alergia a algunos de los componentes y en pacientes aquejados de pancreatitis (inflamación del páncreas).

## PRECAUCIONES

Pueden presentarse intolerancias en pacientes con alergia a las proteínas del cerdo. En caso de que los síntomas empeoren o persistan más de 10 días, aparezcan dolor abdominal intenso e inexplicado, vómitos, náuseas, consulte a su médico.

## ADVERTENCIA

### Importante para la mujer

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Pankreoflat<sup>®</sup> grageas** contiene 256,4 mg de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

## INTERACCIONES

Es conveniente eliminar la ingestión de bebidas alcohólicas concentradas, puesto que disminuyen la actividad de los fermentos. Los antiácidos, como carbonato cálcico o hidróxido de magnesio, pueden anular los efectos terapéuticos de estas enzimas. Puede disminuir la absorción de hierro. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos.

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

En caso de alergia a alguno de los componentes pueden producirse erupciones cutáneas. Ocasionalmente pueden aparecer molestias digestivas.

### **INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO**

En caso de ingestión de grandes cantidades pueden aparecer trastornos gastrointestinales, calambres, diarreas, dolor o hinchazón en las articulaciones. Si esto ocurriera, consulte a su médico o llame al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562.04.20

### **PRESENTACION**

Envases con 20 y 50 grageas.

### **SIN RECETA MEDICA**

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



SOLVAY PHARMA, S.A.  
C/Ramón y Cajal, 2  
08150 Parets del Vallés (Barcelona)