

# Betatul® X

## apósitos de uso tópico

Apósitos de tul malla hidrófila de 10 x 10 cm. impregnados con un gel de Povidona iodada

### COMPOSICION por apósito

Povidona iodada 0,250 g ; Polietilenglicol 400, 4000 y 6000, Agua c.s.p. 1 apósito

### ACCION FARMACOLOGICA

Antiséptico.

### INDICACIONES

Está indicada como antiseptia cutánea en :

- Quemaduras
- Heridas profundas
- Tratamiento complementario de úlceras (profundas, por decúbito, varicosas)

### POSOLOGIA

Aplicación diaria o cada 2 días.

### MODO DE EMPLEO

Abrir el sachet y quitar el plástico.

Aplicar sobre la herida la compresa impregnada. Recubrir con una gasa o algodón. Sujetar por medio de una venda.

### CONTRAINDICACIONES

No debe ser aplicada a enfermos que presentan intolerancia al yodo.

### INCOMPATIBILIDAD Y EFECTOS SECUNDARIOS

No deben utilizarse al mismo tiempo derivados mercuriales.

En los raros casos en que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse el tratamiento.

### INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

Lavado de la zona lesionada y aplicación local de antiinflamatorios, incluyendo los corticoides.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20

### PRESENTACION

Envase con 10 sachets de 1 apósito.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
SIN RECETA MEDICA

VIATRIS

VIATRIS Pharmaceuticals SAU  
Av. Castilla, 2  
Parque Empresarial San Fernando  
28830 San Fernando de Henares (Madrid)